



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL “DR. ROBERTO
MASFERRER”**



PROTOCOLO PARA ESTIMAR LA EDAD CLÍNICA

MO

DATOS GENERALES:

Institución que lo solicita: _____.

Nombre del solicitante: _____.

Número de oficio: _____, Número de referencia: _____.

Lugar del reconocimiento: _____, Fecha: _____, Hora: _____.

Nombre del paciente: _____.

Salvadoreño Otra nacionalidad (especifique): _____, ND .

Fecha de nacimiento: _____, Edad referida: _____, Fotografía para identificación: Sí No . Sexo: Hombre Mujer Género: Masculino Femenino . Orientación sexual: L G B T I . Otro (especifique): _____. N/D . Nombre con el que se identifica: _____.

Actividad manual: _____, Escolaridad: _____, Ocupación: _____.

Dirección de residencia: _____.

Área geográfica: Urbana Rural Municipio: _____, Departamento: _____.

Nombre del acompañante o representante legal (en casos de tratarse de personas menores de edad o de personas incapaces): _____.

Tipo de documento: _____, Número de documento: _____, Relación o parentesco: _____, Dirección de residencia: _____.

SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO INFORMADO: Sí No

ANTECEDENTES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS: _____.

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS: No contributorios . _____.

EXAMEN FÍSICO:

Complejión física: Delgada Mediana Obesa . Presencia de bigote y barba: Ausente Esbozo Completo . Presencia de vello en tórax anterior: Ausente Esbozo Completo . Desarrollo muscular: Infantil Adolescente Adulto . Timbre de voz: Infantil Adolescente (disfonía) Adulto .

ESTADÍOS DE TANNER

ESCALA DE TANNER PARA LAS MAMAS FEMENINAS

Tanner I o prepuberal	Sin tejido glandular; laaréola sigue los contornos de la piel del tórax. Edad normalmente menor de 10 años.
Tanner II	Botón mamario, con una pequeña zona de tejido glandular; laaréola comienza a ensancharse. Edad entre 10 y 11.5 años.
Tanner III	La mama comienza a elevarse y se extiende más allá de los límites de laaréola que continúa aumentando, pero permanece dentro del contorno mamario. Edad entre 11.5 a 13 años.
Tanner IV	Elevación y aumento de los senos; aréola y pezón forman un montículo secundario que sobresale del reborde de la mama. Edad entre 13 y 15 años.
Tanner V	La mama alcanza su tamaño definitivo de adulto; laaréola vuelve al nivel de la superficie mamaria, pero el pezón sigue haciendo prominencia. Edad 15 años o mayor.

ESCALA DE TANNER PARA LOS GENITALES MASCULINOS

Tanner I o prepuberal	Volumen testicular menor de 1.5 ml. Ene pequeño de 5cm. o menos. Edad normalmente menor de 11 años
Tanner II	Volumen testicular entre 1.6 y 6 ml. La piel del escroto se adelgaza, se enrojece y se agranda. La longitud del pene sin ambos al Tanner I. Edad entre 11 y 13 años
Tanner III	Volumen testicular entre 12 y 20 ml. El escroto se agranda aún más. El pene comienza a alargarse. Edad entre 13 y 14.5 años.
Tanner IV	Volumen testicular entre 6 y 12 ml. El escroto se agranda más y se oscurece. El pene incrementa su longitud. Edad entre 14.5 y los 16 años.
Tanner V	Volumen testicular mayor de 20ml. Escroto y pene de adulto. Edad entre 16 años o mayor.

ESCALA DE TANNER PARA VELLO PÚBLICO (MASCULINO Y FEMENINO)

Tanner I o prepuberal	Sin vello púbico. Edad de 10 años o menor
Tanner II	Pequeña cantidad de vello largo y aterciopelado con una ligera pigmentación en la base del pene y el escroto (hombres) o en los labios mayores (mujeres). Edad entre 10 a 11.5 años.
Tanner III	El vello se vuelve más grueso y rizado y comienza a extenderse lateralmente. Edad entre 11.5 y 13 años.
Tanner IV	Las características del vello son similares a las del adulto; se extiende a través del pubis, pero no alcanza los muslos. Edad entre las 13 a 15 años.
Tanner V	El vello se extiende por la superficie medial de los muslos. Edad 15 años o mayor.

FUENTE: Tanner, J. (1962).

EXAMEN DE LA CAVIDAD ORAL: Visual Radiológica Ambas .

EXAMEN CLÍNICO:

Dentición primaria: _____
_____.

Dentición mixta: _____
_____.

Dentición permanente: _____
_____.

Edéntulo: _____
_____.

EXAMEN RADIOLÓGICO:

Radiografía periapical: _____
_____.

Radiografía extra oral: _____
_____.

Método utilizado para estimación de edad: Inspección física de la cavidad oral y corporal (Estadios de Tanner) y radiológica (si se hubiese realizado)

Fotografías tomadas: Sí No Cantidad: _____.

COMENTARIO MÉDICO LEGAL: _____

_____.

CONCLUSIONES:

Por las características físicas (estadios de Tanner) y características odontológicas

Por las características físicas (estadios de Tanner), características odontológicas y radiológicas

consideramos que la edad clínica aproximada es de: _____.

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO FORENSE

FIRMA Y SELLO DEL ODONTÓLOGO FORENSE