CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL "DR. ROBERTO MASFERRER"

PROTOCOLO PARA ESTIMAR LA EDAD

M

DATOS GENERALES:

Institución que lo solicita: _____.

Nombre del solicitante: _____.

Número de oficio: _____. Número de referencia: _____.

Lugar del reconocimiento: _____. Fecha: _____. Hora: _____.

Nombre del paciente: _____.

Salvadoreño ☐ Otra nacionalidad (especifique): _____. ND ☐.

Fecha de nacimiento: _____. Edad referida: _____. Fotografía para identificación: Sí ☐ No ☐. Sexo: Hombre ☐ Mujer ☐ Género: Masculino ☐ Femenino ☐. Orientación sexual: L ☐ G ☐ B ☐ T ☐ I ☐. Otro (especifique): _____. N/D ☐. Nombre con el que se identifica: _____ _____. Actividad manual: _____.

Escolaridad: _____. Ocupación: _____. Dirección de residencia: _____ _____.

Área geográfica: Urbana ☐ Rural ☐ Municipio: _____. Departamento: _____.

Nombre del acompañante o representante legal (en casos de tratarse de personas menores de edad o de personas incapaces): _____.

Tipo de documento: _____. Número de documento: _____. Relación o parentesco: _____. Dirección de residencia: _____ _____.

SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO INFORMADO: **Sí** ☐ **No** ☐

ANTECEDENTES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS: _____ _____.

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS: No contributorios ☐. _____ _____

EXAMEN FÍSICO:

Complexión física: Delgada ☐ Mediana ☐ Obesa ☐. Presencia de bigote y barba: Ausente ☐ Esbozo ☐ Completo ☐. Presencia de vello en tórax anterior: Ausente ☐ Esbozo ☐ Completo ☐. Desarrollo muscular: Infantil ☐ Adolescente ☐ Adulto ☐. Timbre de voz: Infantil ☐ Adolescente (disfonía) ☐ Adulto ☐

.

ESTADÍOS DE TANNER

ESCALA DE TANNER PARA LAS MAMAS FEMENINAS

Tanner I o prepuberal	Sin tejido glandular; la aréola sigue los contornos de la piel del tórax. Edad normalmente menor de 10 años
Tanner II	Botón mamario, con una pequeña zona de tejido glandular; la aréola comienza a ensancharse. Edad entre 10 y 11.5 años
Tanner III	La mama comienza a elevarse y se extiende más allá de los límites de la aréola que continúa aumentando, pero permanece dentro del contorno mamario. Edad entre 11.5 a 13 años.
Tanner IV	Elevación y aumento de los senos; aréola y pezón forman un montículo secundario que sobresale del reborde de la mama. Edad entre 13 y 15 años.
Tanner V	La mama alcanza su tamaño definitivo de adulto; la aréola vuelve al nivel de la superficie mamaria, pero el pezón sigue haciendo prominencia. Edad 15 años o mayor.

ESCALA DE TANNER PARA LOS GENITALES MASCULINOS

Tanner I o prepuberal	Volumen testicular menor de 1.5 ml. Ene pequeño de 5cm. o menos. Edad normalmente menor de 11 años
Tanner II	Volumen testicular entre 1.6 y 6 ml. La piel del escroto se adelgaza, se enrojece y se agranda. La longitud del pene sin ambos al Tanner I. Edad entre 11 y 13 años
Tanner III	Volumen testicular entre 12 y 20 ml. El escroto se agranda aún más. El pene comienza a alargarse. Edad entre 13 y 14.5 años.
Tanner IV	Volumen testicular entre 6 y 12 ml. El escroto se agranda más y se oscurece. El pene incrementa su longitud. Edad entre 14.5 y los 16 años.
Tanner V	Volumen testicular mayor de 20ml. Escroto y pene de adulto. Edad entre 16 años o mayor.

ESCALA DE TANNER PARA VELLO PÚBICO (MASCULINO Y FEMENINO)

Tanner I o prepuberal	Sin vello púbico. Edad de 10 años o menor
Tanner II	Pequeña cantidad de vello largo y aterciopelado con una ligera pigmentación en la base del pene y el escroto (hombres) o en los labios mayores (mujeres). Edad entre 10 a 11.5 años.
Tanner III	El vello se vuelve más grueso y rizado y comienza a extenderse lateralmente. Edad entre 11.5 y 13 años.
Tanner IV	Las características del vello son similares a las del adulto; se extiende a través del pubis, pero no alcanza los muslos. Edad entre las 13 a 15 años.
Tanner V	El vello se extiende por la superficie medial de los muslos. Edad 15 años o mayor.

FUENTE: Tanner, J. (1962).

EXAMEN DE LA CAVIDAD ORAL: Visual ☐

Erupción de las segundas molares (permanentes). No erupcionadas ☐ Incompletas ☐ Completas.

Erupción de las terceras molares (permanentes). No erupcionadas ☐ Incompletas ☐ Completas.

Método utilizado para estimación de edad: Inspección física de la cavidad oral y corporal (Estadios de Tanner)

Fotografías tomadas: SÍ ☐ NO ☐ Cantidad: _____.

COMENTARIO MÉDICO LEGAL: _____

_____

_____

_____

_____.

CONCLUSIONES:

Por las características físicas (estadios de Tanner) y características odontológicas, considero que la edad clínica aproximada es de: _____.

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO FORENSE